

Saprodi

- Ook in vroeg stadium goed rooibaar
- Hoge zetmeelproductie, laag suikergehalte
- Vlokkengeslacht

Door gebruik van de werkzame stof "Bentazon" kan gewasschade optreden.



Eigenschappen

Ras	Saprodi
Rijptijd	Midden laat
Knollen – Vorm	Ovaal
Knollen – Vleeskleur	Licht geel
Knollen – Schilkleur	Geel
Opbrengst	Zeer goed
Bestemming	Zetmeel/Vlokken
Phytophthora – Loof	6
Phytophthora – Knol	7
Schurft	7
Bladrol	7
A - Virus	7
X - Virus	7,5
Yn - Virus	7,5
Droogte resistentie	7
AM resistentie – Ro 1,4	9 / rv 0,0 %
AM resistentie – Ro 2,3	9 / rv 0,2 %
AM resistentie – Pa 2	9 / rv 0,2 %
AM resistentie – Pa 3	9 / rv 0,1 %
AM – tolerantie	8
Wratziekte - Fysio 1	Resistent
Wratziekte - Fysio 2/6	Resistent
Wratziekte - Fysio 18	Resistent
Bemestingsadvies N	160-200 kg/ha (incl. bodemvoorraad) <small>N toedienen als gedeelde gift heeft de voorkeur. Het toedienen van de sporenelementen Borium en Calcium wordt sterk aanbevolen.</small>
Bemestingsadvies P	Op basis van bodemanalyse
Bemestingsadvies K	200-240 kg/ha
Pootafstand (35/55 mm)	32 - 35 cm

Havenweg 14, 1771 RW Wieringerwerf, The Netherlands
 info@royalzap.nl | www.royalzap.nl | + 31 (0) 223 531 436